

Руководство по применению инсектицидного средства «Тетрагон»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Инсектицидное средство «Тетрагон» в форме концентрата эмульсии представляет собой жидкость светло-желтого цвета.

В состав средства в качестве ДВ входят: циперметрин – 10% и тетраметрин – 1,5%, ППБ, ПАВ и вспомогательные вещества.

Средство «Тетрагон» обладает широким спектром инсектицидного действия, в отношении синантропных насекомых. Обладает острым и длительным остаточным действием — до 1 месяца.

Средство «Тетрагон» предназначено для применения специалистами ветеринарной службы, специалистами животноводческих и птицеводческих хозяйств, с целью уничтожения синантропных членистоногих (тараканов всех видов, клопов, блох, муравьев, имаго и личинок мух, имаго и личинок комаров, жуков чернотелок) на объектах ветеринарного надзора:

- производственных и «жилых» помещениях, фермах, скотных дворах, животноводческих, свиноводческих, звероводческих, птицеводческих хозяйствах, молочных блоках и кормокухнях, складских помещениях, помещениях для производства комбикормов и премиксов; цехах утилизации бытовых объектов;
- производственных помещениях на предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей промышленности и цехах по переработке продуктов убоя, помещениях санитарных боен на мясокомбинатах и убойных пунктах, холодильных камерах;
- складских помещениях, карантинных базах и других подконтрольных объектах, а также открытых объектов (рампы, эстакады, платформы), мест скопления животных (территория и объекты предубойного содержания, рынки, выставки и др.), залов для съемки шкур в звероводстве;
- помещениях в зоопарках, цирках, выставках, спортплощадках;
- ветеринарных учреждениях (лечебницы, клиники, станции, лаборатории, виварии, питомники, изоляторы).
- территориях, окружающих животноводческие, звероводческие, птицеводческие помещения, выгулов, дорог и т. д.

Дезинсекцию проводят ветеринарные специалисты или лица, обученные безопасной работе с инсектицидными средствами, путем выборочного опрыскивания поверхности рабочим раствором препарата.

Не проводить обработку аэрозольным оборудованием в присутствии животных!

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

Для приготовления водной эмульсии средства «Тетрагон» используют свежеприготовленные эмульсии в концентрациях 0,1-0 25% по ДВ. Готовую эмульсию следует использовать в течение 48 часов и перед применением тщательно взбалтывать.

Расчёт количества средства «Тетрагон», необходимого для приготовления рабочих водных эмульсий.

Вид насекомого	Концентрация по ДВ, (%)	Количество средства (мл) на 1 л воды
Тараканы	0,25	22
Мухи имаго	0,2	17,5
Мухи личинки	0,25	22
Блохи	0,15	13
Постельные клопы	0,10	10
Рыжие домовые муравьи	0,10	10
Комары: Личинки/имаго	0,15	13
	0,10	10

Норма расхода рабочего раствора средства, при применении ручных помповых опрыскивателей, моторных ранцевых опрыскивателей составляет 50 мл/м² на непитывающих влагу поверхностях (на впитывающих влагу поверхностях расход рабочего раствора может быть увеличен до 2-х раз).

Убирают с обработанных поверхностей (влажным способом) через 24 часа после применения средства, но не позднее, чем за 3 часа до начала рабочего дня. Из других мест средство удаляют через 2 месяца или после потери его эффективности. Повторные обработки проводятся по энтомологическим показателям.

Средство «Тетрагон» идеально прилипает к любой поверхности, образуя инсектицидную пленку, что приводит к увеличению продолжительности действия и, как следствие, позволяет достичь максимальной эффективности не только при обработке внутри помещений, но и при применении снаружи.

В животноводческих помещениях особое внимание уделяют поверхностям, находящимся вне доступа животных, на которых остаются остатки пищи, брызги, слюна животных, которые предпочитают насекомые. Избегайте обработки поверхностей, с которыми могут контактировать животные (поверхности стен следует опрыскивать, отступая от поверхности пола на высоту от 0,5-1,5 м в зависимости от вида животного), а также участков, где находится корм животных и поилки с водой.

Для уничтожения имаго комнатных или других видов мух в помещениях используют 0,2% (по ДВ) рабочий раствор, которым орошают места посадки мух в жилых и производственных помещениях: стекла и рамы окон, дверные коробки и т. д. Норма расхода рабочего раствора составляет 50 мл/м². При сильной загрязненности помещения, большой численности мух, а также с целью получения более длительного остаточного действия можно использовать 0,25 % (по ДВ) рабочий раствор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обработку помещений следует проводить в отсутствии людей, животных, птиц, рыб. Продукты и корма перед обработкой следует удалить или тщательно укрыть. При обработке цехов промышленных предприятий предварительно убрать и тщательно укрыть продукцию, которая может адсорбировать препарат. Помещение после обработки следует

хорошо проветрить не менее 30 минут. После проведения дезинсекции проводят влажную уборку помещения с использованием мыльно-содового раствора.

Помещениями, обработанными средством, нельзя пользоваться до их уборки, которую проводят не позднее, чем за 3 часа до использования объекта по назначению. Уборку проводят в перчатках, используя содовый раствор (30-50 г кальцинированной соды на 1 л воды). Работающие со средством должны соблюдать следующие меры предосторожности: перед началом работы со средством дезинструктор проводит инструктаж по технике безопасности и мерам оказания первой помощи. Лица, проводящие дезинсекцию, расфасовку препарата, приготовление эмульсий, должны пользоваться индивидуальными средствами защиты. Индивидуальные защитные средства включают: халат или комбинезон, перчатки резиновые технические, герметичные защитные очки, респираторы универсальные с противогазовым патроном марки "А" ("РУ-60М", "РПГ-67" или противогаз и др.)

При работе со средством обязательно соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, принимать пищу и пить в обрабатываемом помещении. После окончания работы с препаратом «Тетрагон» прополаскивают рот, моют руки и лицо водой с мылом.